

# Pembro + FP療法

## 投与スケジュール

Day	1	2	3	4	5	...	21
ペムブロリズマブ 200mg/body 30分	↓						
フルオロウラシル 800mg/m <sup>2</sup> 24時間	↓	↓	↓	↓	↓		
シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> 2時間	↓						

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食100mL+キイトルーダ200mg/body	30分
1	②	生食50mL	フラッシュ(5分)
1	③	生食1000mL+フルオロウラシル800mg/m <sup>2</sup>	24時間
1	④	ビカネイト500mL	1時間
1	⑤	ビカネイト500mL	1時間
1	⑥	生食50mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	30分
1	⑦	パロノセトロンバック0.75mg50mL +デキサート9.9mg+アロカリス235mg	30分
1	⑧	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>	2時間
1	⑨	20%マンニトール300mL	1時間
1	⑩	ビカネイト500mL+フロセミド20mg2mL	1時間
1	⑪	ビカネイト500mL	1時間

※③メイン、④～⑪側管より投与

Day	投与順	投与量	投与方法
2, 3, 4, 5	①	生食1000mL+フルオロウラシル800mg/m <sup>2</sup>	24時間
2, 3, 4, 5	②	生食50mL+デキサート3.3mg	30分
2, 3, 4	③	ビカネイト500mL	5時間
2, 3, 4	④	ビカネイト500mL	5時間
2, 3	⑤	ビカネイト500mL	5時間

※①メイン、②～⑤側管より投与