

RAM+FOLFIRI療法

投与スケジュール

| Day | 1 | 2 | | 14 |
|--------------------------------------|---|---|-------|----|
| ラムシルマブ8mg/kg 1時間 | ↓ | | | |
| イリノテカン150mg/m ² 90分 | ↓ | | | |
| レボホリナート200mg/m ² 2時間 | ↓ | | | |
| 5-フルオロウラシル400mg/m ² 急速静注 | ↓ | | | |
| 5-フルオロウラシル2400mg/m ² 46時間 | ↓ | ↓ | | |

レジメン

| Day | 投与順 | 投与量 | 投与方法 |
|-----|-----|---|------|
| 1 | ① | パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg+ポララミン5mg5mL | 15分 |
| | ② | サイラムザ8mg/kg+生食250mL | 1時間 |
| | ③-1 | イリノテカン150mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL | 90分 |
| | ③-2 | レボホリナート200mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL | 2時間 |
| | ④ | 5-フルオロウラシル400mg/m ² +生食50mL | 全開で |
| | ⑤ | 5-フルオロウラシル2400mg/m ² +生食100mL | 46時間 |

※⑤ インフューザーポンプ 3mL/h 全量140mLとする。