

# GemCis療法

## 投与スケジュール

Day	1	2	……	9	……	16	……	28
ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup> 30分		↓		↓		↓		
シスプラチン 70mg/m <sup>2</sup> 2時間		↓						

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	ヒシナルク3号500mL	フリー
1	②	ヴィーンF注500mL	フリー
1	③	ヒシナルク3号500mL	フリー
1	④	ヴィーンF注500mL	フリー

Day	投与順	投与量	投与方法
2	①	ヒシナルク3号500mL	フリー
2	②	ヴィーンF注500mL	フリー
2	③	ヒシナルク3号500mL	フリー
2	④	ヴィーンF注500mL	フリー
2	⑤	ヒシナルク3号500mL	フリー
2	⑥	ヴィーンF注500mL	フリー
2	⑦	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート13.2mg	30分
2	⑧	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	30分
2	⑨	フロセミド注20mg2mL	フリー
2	④	生食500mL+シスプラチン70mg/m <sup>2</sup>	3時間

Day	投与順	投与量	投与方法
9, 16	①	生食50mL	フリー
9, 16	②	生食100mL+デキサート6.6mg	30分
9, 16	③	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	30分

※①ルート確保、ウォッシュ用、②～③側管より投与