

TC±Bev療法

卵巣癌

投与スケジュール

Day	1	…	21
パクリタキセル 175mg/m ² 3時間	↓		
カルボプラチン AUC (5-)6 1時間	↓		

Day	1	…	21
パクリタキセル 175mg/m ² 3時間	↓		
カルボプラチン AUC (5-)6 1時間	↓		
ベバシズマブ 15mg/kg 90→60→30分	↓		

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食250mL	メイン
1	②	生食50mL+ファモチジン20mg+デキサート39.6mg+ポララミン5mg	フリー
1	③	グラニセトロンバッグ1mg/50mL+アロカリス235mg	30分
1	④	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	3時間
1	⑤	生食250mL+カルボプラチンAUC(5-)6	1時間

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食250mL	メイン
1	②	生食50mL+ファモチジン20mg+デキサート39.6mg+ポララミン5mg	フリー
1	③	グラニセトロンバッグ1mg/50mL+アロカリス235mg	30分
1	④	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	3時間
1	⑤	生食250mL+カルボプラチンAUC(5-)6	1時間
1	⑥	生食100mL+ベバシズマブ15mg/kg	90分→60分→30分