

# TP + Bev療法

## 投与スケジュール

Day		1	2	……	21
パクリタキセル 135mg/m <sup>2</sup>	1時間	↓			
シスプラチン 50mg/m <sup>2</sup>	2時間		↓		
ベバシズマブ 15mg/kg	90→60分→30分		↓		

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食50mL+デキサート39.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	15分(側管)
1	②	5%糖液250mL+パクリタキセル67.5mg/m <sup>2</sup>	12時間
1	③	5%糖液250mL+パクリタキセル67.5mg/m <sup>2</sup>	12時間
2	④	生食500mL	1時間
2	⑤	フィジオ140 500mL	1時間
2	⑥	フィジオ140 500mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	1時間
2	⑦	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg	15分
2	⑧	生食500mL+シスプラチン50mg/m <sup>2</sup>	2時間
2	⑨	生食100mL+アバスチン15mg/kg	90分→60分→30分
2	⑩	フィジオ140 500mL	1.5時間
2	⑪	フィジオ140 500mL	1.5時間
2	⑫	フィジオ140 500mL	1.5時間
3	⑬	フィジオ140 500mL	2.5時間
3	⑭	ヒシナルク3号500mL	2.5時間
3	⑮	フィジオ140 500mL	2.5時間
3	⑯	ヒシナルク3号500mL	2.5時間
3	⑰	生食50mL+デキサート6.6mg	15分(側管,午前中)

\* Day1:アブレピタント125mg、Day2,3:アブレピタント80mg服用