

TP療法

投与スケジュール

Day		1	2	21
	パクリタキセル 135mg/m2 シスプラチニン 50mg/m2	24時間	↓		
		2時間	↓		

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食50mL+デキサート39.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	15分(側管)
1	②	5%糖液250mL+パクリタキセル67.5mg/m2	12時間
1	③	5%糖液250mL+パクリタキセル67.5mg/m2	12時間
2	④	生食500mL	1時間
2	⑤	フィジオ140 500mL	1時間
2	⑥	フィジオ140 500mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	1時間
2	⑦	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg	15分
2	⑧	生食500mL+シスプラチニン50mg/m2	2時間
2	⑨	フィジオ140 500mL	1.5時間
2	⑩	フィジオ140 500mL	1.5時間
2	⑪	フィジオ140 500mL	1.5時間
3	⑫	フィジオ140 500mL	2.5時間
3	⑬	ヒシナルク3号500mL	2.5時間
3	⑭	フィジオ140 500mL	2.5時間
3	⑮	ヒシナルク3号500mL	2.5時間
3	⑯	生食50mL+デキサート6.6mg	15分(側管,午前中)

*Day1:アプレビタント125mg、Day2,3:アプレビタント80mg服用