

XP+Trastuzumab療法

投与スケジュール

Day	1	2	3	……	15	……	21
トラスツズマブ 初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg	↓						
90→30分							
シスプラチン 60mg/m ²	↓						
2時間							
カペシタビン 2000mg/m ² /day		↓	↓	↓	↓		
分2 朝食後・夕食後	↓	↓	↓	↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	ヒシナルク3号500mL	フリー
1	②	ヒシナルク3号500mL	フリー
1	③	ヒシナルク3号500mL	フリー
1	④	ビカネイト500mL	1時間
1	⑤	ビカネイト500mL	1時間
1	⑥	生食50mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	30分
1	⑦	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg+アロカリス235mg	30分
1	⑧	生食250mL+トラスツズマブ 6 mg/kg(初回8mg/kg)	30分(初回90分)
1	⑨	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	2時間
1	⑩	20%マンニトール300mL	1時間
1	⑪	ビカネイト500mL+フロセミド20mg2mL	1時間
1夕~15朝		カペシタビン2000mg/m ²	経口 1日2回朝夕食後

※①~③：メイン、④~⑪：側管