

ENCO+Cmab+mFOLFOX6療法

大腸癌

投与スケジュール

Day	1	2	3		14
セツキシマブ 500mg/m ²	↓				
オキサリプラチン 85mg/m ² 2時間	↓				
レボホリナート 200mg/m ² 2時間	↓				
5-フルオロウラシル 400mg/m ² (急速静注)	↓				
5-フルオロウラシル 2400mg/m ² (持続静注 46時間)	↓	↓			
エンコラフェニブ 300mg/day 1日1回	↓	↓	↓	↓	↓

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食50mL	ルート確保
1	②	パロノセトロン0.75mg/50mL+デキサート9.9mg +ファモチジン20mg+ポラミン5mg	15分
1	③	アービタックス500mg/m ² +生食250mL	2時間
1	④	生食100mL	60分
1	⑤-1	オキサリプラチン85mg/m ² +5%糖液250mL	2時間
1	⑤-2	レボホリナート200mg/m ² +5%糖液250mL	2時間
1	⑥	5-フルオロウラシル400mg/m ² +生食50mL	全開で
1	⑦	5-フルオロウラシル2400mg/m ²	46時間(インフューザー)
連日		ビラフトビ 300mg/day	経口 1日1回

※⑦ トレフューザー 3mL/h 全量140mLとする。