

対象		選択薬剤	用法・容量・治療期間
小児	新生児・0歳～5歳	タミフル® (オセルタミビル) ラビアクタ® (ペラミビル)	<ul style="list-style-type: none"> タミフル® : 5日間 0歳 : 3 mg/kg 1日2回内服 1歳～ : 体重>37.5 kg : 75 mg 1日2回内服 体重≤37.5 kg : 2 mg/kg 1日2回内服
	6歳～	タミフル® (オセルタミビル) イナビル® (ラニナミビル) ラビアクタ® (ペラミビル) リレンザ® (ザナミビル) ※院外専用 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> イナビル® : 1日間 ～9歳 : 20 mg 単回吸入 10歳以降 : 40 mg 単回吸入
	呼吸器症状が強い 呼吸器疾患あり	タミフル® (オセルタミビル) ラビアクタ® (ペラミビル)	<ul style="list-style-type: none"> ラビアクタ® : 1～2日間 体重<60 kg : 10 mg/kg 単回投与 体重≥60 kg : 600 mg 単回投与 リレンザ® : 10 mg 1日2回吸入 5日間
成人	重症	タミフル® (オセルタミビル) ラビアクタ® (ペラミビル)	<ul style="list-style-type: none"> タミフル® : 5日間 Ccr>30 : 75 mg 1日2回内服 10<Ccr≤30 : 75 mg 1日1回内服 Ccr≤10 : 推奨しない
	入院 肺炎あり	タミフル® (オセルタミビル) イナビル® (ラニナミビル) ラビアクタ® (ペラミビル) リレンザ® (ザナミビル) ※院外専用 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> イナビル® : 40 mg 単回吸入 1日間
	入院 肺炎なし	タミフル® (オセルタミビル) イナビル® (ラニナミビル) ラビアクタ® (ペラミビル) リレンザ® (ザナミビル) ※院外専用 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> ラビアクタ® : 1～2日間 Ccr≥50 : 300 mg(最大600 mg) 単回投与 30<Ccr<50 : 100 mg(最大200 mg) 単回投与 Ccr≤30 : 50 mg(最大100 mg) 単回投与
	外来	タミフル® (オセルタミビル) イナビル® (ラニナミビル) リレンザ® (ザナミビル) ※院外専用 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> リレンザ® : 10 mg 1日2回吸入 5日間
	妊婦	タミフル® (オセルタミビル) イナビル® (ラニナミビル) リレンザ® (ザナミビル) ※院外専用 (予定)	

参照 :

厚生労働省 成人のインフルエンザ治療ガイドライン 第2版
 一般社団法人日本感染症学会提言～抗インフルエンザ薬の使用について～
 小児科学会 2024/25 シーズンのインフルエンザ治療・予防指針
 国立成育医療研究センター(https://www.ncchd.go.jp/kusuri/news_med/h1n1.html)