


抗ウイルス薬


RDV  
NMV/r  
MOL




免疫抑制・調整薬  
抗凝固療薬

ステロイド  
ヘパリン



 バキロビッド相互作用検索ツール  
(製薬企業サイト)  
添付文書に記載の併用禁忌薬・  
併用注意薬を簡便に検索可能

 バキロビッドとの併用に慎重  
になるべき薬剤リスト  
(国立国際医療研究センター病院)  
併用薬の対応等の情報あり

※上記検索ツールおよびリストは、相互作用の  
可能性がある薬剤すべてに対応していません

	略語	一般名	商品名	用法用量	投与期間
抗ウイルス薬	RDV	レムデシビル	ベクルリー®	初日：200 mg 2日目以降：100 mg 1日1回 ※腎機能用量調節不要	軽症3日間 中等症以上5~10日間
	NMV/r	ニルマトレルビル/リトナビル	パキロビッド®	eGFR≥60：600/200 mg分2 30≤eGFR<60：300/100 mg分2 ※CYP3Aを強力に阻害するため相互作用に注意	5日間
	MOL	モルヌピラビル	ラゲブリオ®	1600 mg分2 ※妊婦禁忌	5日間
免疫抑制・調整薬	Dexa	デキサメサゾン	デカドロン錠® デキサート注®	6 mg分1 6.6 mg 1日1回	10日間または退院まで
※デキサメサゾンが使用できない場合の代替薬：ヒドロコルチゾン 150 mg、メチルプレドニゾン 32 mg、プレドニゾン 40 mg					
抗凝固療薬		未分画ヘパリン		10,000単位/日あるいは200単位/kg日	