

EPd療法（1-2コース目）

多発性骨髄腫

投与スケジュール

Day	1		8		15		21	22		28
エロツズマブ 10mg/kg	↓		↓		↓			↓		
デキサメタゾン 29.7mg 15分	↓		↓		↓			↓		
ポマリドミド 4mg 経口	↓						↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,8,15,22	①	生食500mL	メイン
1,8,15,22	②	生食50mL+デキサート29.7mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1,8,15,22		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与45分前
1,8,15,22	③	エムプリシディ 10mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		ポマリスト4mg	経口

EPd療法（1-2コース目；75歳を超える場合）

投与スケジュール

Day	1		8		15		21	22		28
エロツズマブ 10mg/kg	↓		↓		↓			↓		
デキサメタゾン 13.2mg 15分	↓		↓		↓			↓		
ポマリドミド 4mg 経口	↓						↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,8,15,22	①	生食500mL	メイン
1,8,15,22	②	生食50mL+デキサート13.2mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1,8,15,22		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与45分前
1,8,15,22	③	エムプリシティ 10mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		ポマリスト4mg	経口

EPd療法 (3コース目以降)

投与スケジュール

Day	1		8		15		21	22		28
エロツズマブ 20mg/kg	↓									
デキサメタゾン 29.7mg 15分	↓									
デキサメタゾン 40mg 経口			↓		↓			↓		
ポマリドミド 4mg 経口	↓						↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食500mL	メイン
1	②	生食50mL+デキサート29.7mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与45分前
1	③	エムプリシディ 20mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		ポマリスト4mg	経口
8,15,22		レナデックス40mg	経口

EPd療法（3コース目以降；75歳を超える場合）

投与スケジュール

Day	1		8		15		21	22		28
エロツズマブ 20mg/kg	↓									
デキサメタゾン 13.2mg 15分	↓									
デキサメタゾン 40mg 経口			↓		↓			↓		
ポマリドミド 4mg 経口	↓						↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食500mL	メイン
1	②	生食50mL+デキサート13.2mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与45分前
1	③	エムプリシディ 20mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		ポマリスト4mg	経口
8,15,22		レナデックス40mg	経口