

# Zolbe+CAPOX療法(初回)

## 投与スケジュール

| Day                        | 1 | 2 | 3 | …… | 15 | …… | 21 |
|----------------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| ゾルベツキシマブ 800mg/m2          | ↓ |   |   |    |    |    |    |
| オキサリプラチン 130mg/m2      2時間 | ↓ |   |   |    |    |    |    |
| カペシタビン 2000mg/m2/day       |   | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  |    |    |
| 分2 朝食後・夕食後                 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  |    |    |    |

## レジメン

| Day    | 投与順 | 投与量                                                              | 投与方法                          |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | ①   | パロノセトロン0.75mg/50mL+デキサート6.6mg<br>+ファモチジン20mg+ポララミン5mg+アロカリス235mg | 30分                           |
| 1      | ②   | 生食50mL                                                           | 5分                            |
| 1      | ③   | ビロイ 800mg/m2+生食1000mL                                            | 100mg/m2/hr～<br>最大400mg/m2/hr |
| 1      | ④   | 生食50mL                                                           | 5分                            |
| 1      | ⑤   | オキサリプラチン130mg/m2+デキサート3.3mg<br>+5%ブドウ糖500mL                      | 2時間                           |
| 1      | ⑥   | 生食50mL                                                           | 5分                            |
| 1夕～15朝 |     | カペシタビン2000mg/m2                                                  | 経口 1日2回朝夕食後                   |