

Zolbe+mFOLFOX6療法(初回)

胃癌

投与スケジュール

Day	1	2	3		14
ゾルベツキシマブ 800mg/m ²	↓				
オキサリプラチン 85mg/m ² 2時間	↓				
レボホリナート 200mg/m ² 2時間	↓				
5-フルオロウラシル 400mg/m ² (急速静注)	↓				
5-フルオロウラシル 2400mg/m ² (持続静注 46時間)	↓	↓			

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	パロノセトロン0.75mg/50mL+デキサート9.9mg +ファモチジン20mg+ポラミン5mg+アロカリス235mg	30分
1	②	生食50mL	5分
1	③	ビロイ800mg/m ² +生食1000mL	100mg/m ² /hr~ 最大400mg/m ² /hr
1	④	生食50mL	5分
1	⑤-1	オキサリプラチン85mg/m ² +5%糖液250mL	2時間
1	⑤-2	レボホリナート200mg/m ² +5%糖液250mL	2時間
1	⑥	5-フルオロウラシル400mg/m ² +生食50mL	全開で
1	⑦	5-フルオロウラシル2400mg/m ²	46時間(インフューザー)

※⑦ トレフューザー 3mL/h 全量140mLとする。